

معاونت بهداشت

همانطور که مستحضرید کمبود ریزمغذی‌ها به ویژه آهن و ویتامین‌های A و D از مشکلات تغذیه‌ای شایع در کودکان زیر ۲ سال کشور بشمار می‌رود. آهن یک ریزمغذی اساسی در تغذیه دوران شیرخواری است، اگر دریافت آن کمتر از میزان مورد نیاز باشد، آن‌ی فقر آهن بروز می‌کند که می‌تواند منجر به اختلال تکامل شیرخوار در یک تا دو سالگی شود. کمبود ریزمغذی‌ها موجب افزایش موارد ابتلا به بیماری‌ها، اختلال در رشد کودکان، تولد نوزاد کم وزن، کاهش بهره‌هوشی، کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی خواهد شد و علاوه بر آن هزینه‌های سنگینی بدلیل مراقبت و درمان به کشور تحمیل می‌شود. در ۶ ماه اول عمر کودک، تغذیه انحصاری با شیر مادر و استفاده از قطره A + D نیازهای تغذیه‌ای شیرخوار را فراهم می‌سازد. مکمل یاری یعنوان یکی از استراتژی‌های عمله برای پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی‌ها در کشور به اجرا گذاشته شده است. لذا ضروری است نکات زیر در خصوص تجویز مکمل‌های دارویی در کودکان، جهت ابلاغ به واحد‌های بهداشتی درمانی مجدداً مورد تأکید قرار گیرد:

- برای کلیه شیرخواران ترم و سالم که با وزن طبیعی متولد می‌شوند (اعم از کودکانی که با شیر مادر و یا شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند) دادن قطره آهن از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه تکمیلی با دوز ۱ mg/kg/d (یک میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودک در روز) حداقل ۱۵ میلی‌گرم آهن المحتال (خالص) در روز تقریباً معادل ۱۵ قطره آهن روزانه توصیه می‌شود و تا پایان ۶ ماهگی شروع سالگی ادامه می‌یابد. در صورتی که بدلیل اختلال رشد کودک، تغذیه تکمیلی بین ۴ تا ۶ ماهگی شروع شود، قطره آهن همزمان با شروع غذای کمکی به میزان ۱۵ قطره در روز باید به شیر خوار داده شود.

- در کودکان نارس و شیر خوارانی که با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می‌شوند (اعم از کودکانی که با شیر مادر و یا شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند)، مکمل آهن با دوز ۲ mg/kg/d (دو میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودک در روز) حداقل ۱۵ میلی‌گرم آهن المحتال (خالص) در روز معادل ۱۵ قطره از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن هنگام تولد می‌شود (حدود ۲ ماهگی) شروع گردیده و تا ۲ سالگی داده شود.

- در شیرخوارانی که وزن تولد بسیار کم (کمتر از ۱۵۰۰ گرم) داشته‌اند، ۲-۴ mg/kg/d (سه تا چهار میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن کودک در روز) حداقل ۱۵ میلی‌گرم آهن المحتال (خالص) در روز معادل ۱۵ قطره آهن روزانه از زمانی که وزن کودک ۲ برابر وزن هنگام تولد شود (حدود ۲ ماهگی) شروع شده و تا ۲ سالگی داده شود.

به مادران توصیه شود برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان‌ها قطره آهن را بین دو وعده شیردهی و در عقب دهان کودک بچکاند و پس از دادن قطره به شیر مادر خوارانی که از ۶ ماهگی قطره آهن را شروع کرده اند آب سالم و بهداشتی بدهند.

- در مرور کودکان نارس که وزنشان ۲ برابر هنگام تولد می‌شود (حدود ۲ ماهگی)، پس از دادن قطره آهن، دادن شیر مادر مانع ندارد. ولی اگر شیر مصنوعی داده می‌شود، قطره آهن نباید همزمان با شیر مصنوعی باشد.

- با توجه به اینکه براساس گزارشات واصل شده، برخی پزشکان (بویژه بخش خصوصی) تجویز قطره آهن را منوط به انجام آزمایش کم خونی می‌نمایند، تاکید شود که به کلیه کودکان بدون انجام آزمایش کم خونی باید در موعد مقرر قطره آهن داده شود.

- همچنین یاد آوری شود که قطره آهن بطور طبیعی موجب تیره شدن رنگ علفه سی گردد که جای نگرانی ندارد.

- مواد غذایی حاوی ویتامین C مانند میوه‌ها و آب میوه‌های تازه و خانگی «ویژه مرگبات موجب افزایش جذب آهن می‌شوند و می‌توان قطره آهن را همراه با آن‌ها که متناسب با سن کودک، باشد توصیه نمود.

- در آموزش تغذیه تكمیلی به مادران، استفاده از مواد غذایی حاوی آهن (کوشت قرمه، مرغ، زرده تخم مرغ، حبوبات (مثل عدس و لوبیا) و سبزی‌های مانند جعفری و گشنیز که در سوپ کودک استفاده می‌شود) تاکید شود.

- برای کلیه شیرخواران اعم از کودکانی که با شیر مادر یا شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند ویتامین D به میزان ۴۰۰ واحد و ویتامین A به میزان ۱۵۰۰ واحد در روز (معادل یک سی سی) از ۲ هفتگی شروع شده و تا پایان ۲ سالگی ادامه می‌یابد. با توجه به انواع مختلف قطره چکان «ورد استفاده توسط شرکت‌های دارویی، توجه به مندرجات روی جعبه قطره آ+د، به منظور مشخص نمودن تعداد قطره‌های معادل ۱ سی سی جهت تجویز و آموزش به مادر ضروری است.

- در آموزش تغذیه تكمیلی به مادران مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین A مانند، زرده تخم مرغ، کره، صیفی جات زرد و نارنجی رنگ مانند هویج و کدو حلوایی و سبزی‌های سبز رنگ مثل جعفری، شوید و گشنیز در غذای کودک متناسب با سن او توصیه می‌شود. همچنین مصرف میوه‌هایی مانند طالبی، موز، آلو، زرد آلو، هلو و شلیل که غنی از ویتامین A هستند برای کودکان توصیه گردد.

(ج)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، روان‌آورانگیزشی

بسمه تعالیٰ

سازه... ۱۳۹۱/۸/۲۵
تاریخ... ۱۳۹۱/۶/۲۶
پرست. نهاد...

معاوقت بهداشت

- در هنگام ارائه قطره آهن و قطره $D + A$ به مادران مراجعه کننده، در مورد لزوم دادن این قطره‌ها به کودک، نحوه و مقدار مصرف آن‌ها آموزش‌های لازم داده شده و زمان مراجعه بعدی برای دریافت قطره‌ها به او با توجه به زمان مراجعات دوره‌ای کودکان در برنامه کودک سالم تأکید شود.

- با توجه به اینکه قطره $D + A$ یا مولتی ویتامین با فرمول دریافت روزانه ۱۵۰۰ واحد ویتامین A و ۴۰۰ واحد ویتامین D و آهن المنتال (خالص) با فرمول حداقل ۱۵ میلی‌گرم در روز مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت در کشور تولید می‌گردد، الزامی است، کارکنان شاغل در واحد‌های بهداشتی درمانی اکیداً از توصیه و مصرف هرگونه مکمل‌های دارویی تجاری که فرمولاسیون آن‌ها با نسبت فوق الذکر تفاوت دارد خودداری نمایند.

در خاتمه با توجه به اهمیت آموزش‌های دوره‌ای در افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی و توانمندی ایشان در انتقال آموزش‌های صحیح به مادران، خواهشمند است دستور فرمائیت، ترتیبی اتخاذ گردد که در برنامه‌های بازآموزی بهورزان، کارданها و کارشناسان تغذیه و کودکان نکات فوق مورد توجه قرار گرفته و در پایش‌های دوره‌ای از اجرای صحیح مفاد این بخش‌نامه به طور مکرر اطمینان حاصل گردد.

دکتر ذهرا عبد‌اللهی
مدیر سلامت و تربیت بدنی
دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمد اسماعیل مطلق
مدیر کل دفتر سلامت بجهات، خانواره و مدارس